

武蔵野交配 MSX-1243 (里まつり)



【特性】

・耐暑性に優れた夏用品種

- カッピングやチップバーンの発生が少なく、最夏期でも使用可能。

・作業性に優れる

- 極立性で葉が平滑なため作業性に優れ、下葉処理も容易。

・播種時期が幅広い

- 最夏期に加え、春・秋品種との端境期にも使用できる。(推奨播種時期: 4~9月)

・生育揃いが良く、一斉収穫に向いている

【栽培上の注意点】

■ 秋播きでは、当社「里きらり」より生育が緩慢になり易いので無理な遅まきは避ける。

■ 5月~8月蒔きでは株間をやや広くとり、株張り良く栽培する。

■ 特に白さび病に対して耐病性はないので、毎作予防に努める。

品種名	推奨播種期 (一般地)												
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
里まつり													

収穫日数: 6~8月播種で約30日、 4~5月/9月播種は約35日

里まつり・里きらり比較データ

品種	草丈	葉柄長	葉幅	葉長	葉枚数	収穫適期
里まつり	31.6	15.5	10.1	16.1	6.8	約30日
里きらり	29.4	15.4	9.9	14.0	5.2	約35日




※7/27播種、8/27調査(茨城県 新治農場)

第61回東京都コンクール (業務用コマツナの部) 1等

主要夏用品種のチップバーン発生率 (当社調べ)

7月28日播種 ※10日目に灌水停止



里まつり
760g/10株

馬力があるため生育後半まで
水を切らずに栽培すれば大株にもできる!!

☆里まつり試作評価(茨城県・群馬県)



カッピング少なく形状きれい



立性で絡まない! 作業性良好

里まつり




規格外がほとんど無い



ジャミ少なく秀品率高い

他品種



廃棄された規格外の青果物

